Consiste en la aplicación de un conjunto de instrumentos seleccionados para detectar posibles cambios en la persona con otras discapacidades intelectuales (no síndrome de Down) e iniciar una derivación para el diagnóstico idóneo.

FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- **Personas con discapacidad intelectual (no síndrome de Down):**
  - **CAMCOG-DS** que forma parte del CAMDEX-DS. Prueba de Exploración Cambridge para la Valoración de los Trastornos Mentales en adultos con Síndrome de Down o con Discapacidad Intelectual (teaediciones.com) Sección 2. Evaluación del/a paciente. **Parte II Examen Cognitivo (CAMCOG-DS).** Herramienta estructurada y estandarizada que permite la evaluación de las formas más frecuentes de demencia y de otros trastornos mentales y físicos presentes en personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual de otra etiología.
  - MCRT - Modified Cued Recall Test: El test de recuerdo verbal selectivo es un procedimiento utilizado para la evaluación de la memoria episódica y el aprendizaje verbal. La prueba aporta datos sobre el recuerdo libre de imágenes y el recuerdo facilitado mediante pistas.
- **Familiares u otro/a referente de convivencia:**
  - **CAMDEX-DS.** Prueba de Exploración CAMBRIDGE para la valoración de los trastornos mentales en personas adultas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. **Sección 1. Entrevista a la persona informante**. Consta de Entrevista familiar única (CAMDEX – DS) y repetición de la misma si se detectan cambios.
- **Profesionales de referencia de la persona usuaria con discapacidad intelectual:**
  - Registro de observación para profesionales (ROP): herramienta profesional interna para la evaluación de cambios significativos en la persona a través de procesos observacionales. Una puntuación de 0 indicaría ausencia de cambios observables. El mayor incremento numérico, mayor incidencia de cambios observados. Instrumento de elaboración propia.

PERIODICIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

EDAD	CAMCOG-DS	MCRT	ROP	CAMDEX_DS
41 años	PRIMERA MEDICIÓN		✳	BASAL
51 años	SEGUNDA MEDICIÓN		✳	✕
56 años	TERCERA MEDICIÓN		BASAL	✕
Siguientes mediciones	2 AÑOS ●●	2 AÑOS ●●	2 AÑOS ●●	SI HAY SIGNOS DE ALERTA

* Se recomienda el ROP en menores de 56 años, sobre todo cuando no hay posibilidad de aplicar CAMCOG-DS y MCRT. En este caso la periodicidad es la misma que en las mencionadas pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

- Guía "El proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual". Down Galicia

CC BY NC ND